



## ESQUEMAS RECOMENDADOS PARA TRATAMENTO DA MALÁRIA

**Tabela 1** – Tratamento das infecções pelo *Plasmodium vivax* ou *Plasmodium ovale* com Cloroquina em 3 dias e Primaquina em 7 dias (esquema curto).

Idade / Peso	Drogas e Doses							
	1º dia			2º e 3º dia			4º ao 7º dia	
	Cloroquina	Primaquina comprimido		Cloroquina	Primaquina comprimido		Primaquina comprimido	
Infantil		Adulto	Infantil		Adulto	Infantil	Adulto	
6-11 meses 5-9 kg	1/2	1	-	1/4	1	-	1/2	-
1-3 anos 10-14 kg	1	2	-	1/2	1	-	1	-
4-8 anos 15-24 kg	1	2	-	1	2	-	2	-
9-11 anos 25-34 kg	2	-	1	2	-	1	-	1
12-14 anos 35-49 kg	3	-	2	2	-	2	-	1
≥ 15 anos ≥ 50 kg	4	-	2	3	-	2	-	2

- Cloroquina: comprimidos de 150 mg,  
- Primaquina infantil: comprimidos de 5 mg e Primaquina adulto: comprimidos de 15 mg.  
- Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.  
- Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária.  
- Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.  
- Não administrar Primaquina para gestantes ou crianças menores de 6 meses (nesses casos usar a Tabela 3).  
- Se surgir icterícia, suspender a Primaquina.  
- Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de Primaquina (Quadro 3).

**Tabela 2** – Tratamento das infecções pelo *Plasmodium vivax* ou *Plasmodium ovale* com Cloroquina em 3 dias e Primaquina em 14 dias (esquema longo).

Idade / Peso	Drogas e Doses							
	1º dia			2º e 3º dia			4º ao 14º dia	
	Cloroquina	Primaquina comprimido		Cloroquina	Primaquina comprimido		Primaquina comprimido	
Infantil		Adulto	Infantil		Adulto	Infantil	Adulto	
6-11 meses 5-9 kg	1/2	1/2	-	1/4	1/2	-	1/4	-
1-3 anos 10-14 kg	1	1	-	1/2	1/2	-	1/2	-
4-8 anos 15-24 kg	1	1	-	1	1	-	1	-
9-11 anos 25-34 kg	2	-	1/2	2	-	1/2	-	1/2
12-14 anos 35-49 kg	3	-	1	2	-	1	-	1/2
≥ 15 anos ≥ 50 kg	4	-	1	3	-	1	-	1



- Cloroquina: comprimidos de 150 mg.
- Primaquina infantil: comprimidos de 5 mg e Primaquina adulto: comprimidos de 15 mg.
- Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.
- Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária.
- Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.
- Não administrar Primaquina para gestantes ou crianças menores de 6 meses (nesses casos usar a Tabela 3).
- Se surgir icterícia, suspender a Primaquina.
- Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de Primaquina (Quadro 3).

**Quadro 3** – Ajuste da dose e tempo de administração da Primaquina para pacientes com peso igual ou superior a 70 kg.

Faixa de Peso (kg)	Dose total de Primaquina (mg)	Tempo de administração (dias)	
		Esquema longo (15 mg/dia)	Esquema curto (30 mg/dia)
70-79	240	16	8
80-89	272	18	9
90-99	304	20	10
100-109	336	22	11
110-120	368	24	12

**Tabela 3** – Tratamento das infecções pelo *Plasmodium malariae* para todas as idades e das infecções por *Plasmodium vivax* ou *Plasmodium ovale* em gestantes e crianças com menos de 6 meses, com Cloroquina em 3 dias.

Idade / Peso	Número de comprimidos por dia		
	Cloroquina		
	1º dia	2º dia	3º dia
< 6 meses / 1-4 kg	1/4	1/4	1/4
6-11 meses / 5-9 kg	1/2	1/4	1/4
1-3 anos / 10-14 kg	1	1/2	1/2
4-8 anos / 15-24 kg	1	1	1
9-11 anos / 25-34 kg	2	2	2
12-14 anos / kg / 35-49 kg	3	2	2
≥ 15 anos / ≥ 50 kg	4	3	3

- Cloroquina: comprimidos de 150 mg.
- Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.
- Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária.
- Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.
- Não administrar Primaquina para gestantes ou crianças menores de 6 meses.



**Tabela 4** – Esquema recomendado para prevenção das recaídas frequentes por *Plasmodium vivax* ou *Plasmodium ovale* com cloroquina semanal em 12 semanas.

Idade / Peso	Número de comprimidos por semana	
	Cloroquina	
< 6 meses / 1-4 kg	1/4	
6-11 meses / 5-9 kg	1/4	
1-3 anos / 10-14 kg	1/2	
4-8 anos / 15-24 kg	3/4	
9-11 anos / 25-34 kg	1	
12-14 anos / 35-49 kg	1 e 1/2	
≥15 anos / ≥ 50 kg	2	

- Cloroquina: comprimidos de 150 mg.  
- Para utilizar esse esquema deve-se ter certeza que o paciente aderiu corretamente ao tratamento convencional.  
- Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.  
- Recomendar ao paciente não se esquecer de tomar todas as doses

**Tabela 5** – Tratamento das infecções por *Plasmodium falciparum* com a combinação fixa de Artemeter+Lumefantrina em 3 dias.

Idade / Peso	Número de comprimidos						
	1º dia		2º dia		3º dia		
	Manhã		Noite	Manhã	Noite	Manhã	Noite
	Artemeter + Lumefantrina	Primaquina comp 15mg	Artemeter + Lumefantrina				
6 meses-2 anos 5-14 kg	1	1/2	1	1	1	1	
3-8 anos 15-24 kg	2	1	2	2	2	2	
9-14 anos 25-34 kg	3	1 e 1/2	3	3	3	3	
≥ 15 anos ≥ 35 kg	4	3	4	4	4	4	

- Comprimido: 20 mg de Artemeter e 120 mg de Lumefantrina; Primaquina: comprimidos de 15 mg.  
- Cada tratamento vem em uma cartela individual, em quatro tipos de embalagem, de acordo com o peso ou idade das pessoas.  
- Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.  
- No primeiro dia, a segunda dose pode ser administrada em intervalo de 8 a 12 horas.  
- Para crianças pequenas, esmagar o comprimido para facilitar a administração, podendo ingerir o comprimido com água ou leite.  
- Recomenda-se administrar o comprimido junto com alimentos.  
- Não administrar a gestantes durante o primeiro trimestre de gravidez, nem crianças menores de 6 meses (nesses casos, usar a Tabela 9)  
- A dose de Primaquina não é necessária quando o paciente não reside, ou permanece, em área de transmissão.



**Tabela 6** – Tratamento das infecções por *Plasmodium falciparum* com a combinação fixa de Artesunato+Mefloquina em 3 dias e Primaquina em dose única.

Idade / Peso	Número de comprimidos por dia						
	1º dia		Primaquina comp 15 mg	2º dia		3º dia	
	Artesunato + Mefloquina			Artesunato + Mefloquina		Artesunato + Mefloquina	
	Infantil	Adulto	Infantil	Adulto	Infantil	Adulto	
6-11 meses 5-8 kg	1	-	1/2	1	-	1	-
1-5 anos 9-17 kg	2	-	1	2	-	2	-
6-11 anos 18-29 kg	-	1	1 e 1/2	-	1	-	1
≥ 12 anos ≥ 30 kg	-	2	3	-	2	-	2

- Comprimido infantil: 25 mg de Artesunato e 50 mg de Mefloquina; adulto: 100 mg de Artesunato e 200 mg de Mefloquina; Primaquina: comprimidos de 15 mg.  
 - Cada tratamento vem em uma cartela individual, em quatro tipos de embalagem, de acordo com o peso ou idade das pessoas.  
 - Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.  
 - Para crianças pequenas, esmagar o comprimido para facilitar a administração, podendo ingerir o comprimido com água ou leite.  
 - Recomenda-se administrar o comprimido junto com alimentos.  
 - Não administrar a gestantes durante o primeiro trimestre de gravidez, nem crianças menores de 6 meses (nesses casos, usar a Tabela 9).  
 - A dose de Primaquina não é necessária quando o paciente não reside, ou permanece, em área de transmissão.

**Tabela 7** – Esquema de segunda escolha, recomendado para o tratamento das infecções por *Plasmodium falciparum* com Quinina em 3 dias, Doxiciclina em 5 dias e Primaquina no 6º dia.

Idade/ Peso	Número de comprimidos por medicamento por dia			
	1º, 2º e 3º dias		4º e 5º dias	6º dia
	Quinina	Doxiciclina	Doxiciclina	Primaquina
8-10 anos 22-29 kg	1 e 1/2	1	1	1
11-14 anos 30-49 kg	2 e 1/2	1 e 1/2	1 e 1/2	2
≥ 15 anos ≥ 50 kg	4	2	2	3

- Sulfato de Quinina: comprimidos de 500 mg do sal; Doxiciclina: comprimidos de 100 mg do sal e Primaquina: comprimidos de 15 mg.  
 - A dose diária de quinina e da Doxiciclina devem ser divididas em duas tomadas de 12/12 horas.  
 - Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.  
 - A Doxiciclina não deve ser dada a gestantes ou crianças menores de 8 anos.  
 - A Primaquina não deve ser dada a gestantes ou crianças menores de 6 meses.  
 - Não administrar a gestantes, nem crianças menores de 6 meses (nesses casos, usar a Tabela 9).  
 - A dose de Primaquina não é necessária quando o paciente não reside, ou permanece, em área de transmissão.



**Tabela 8** – Tratamento das infecções mistas por *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium vivax* ou *Plasmodium ovale*.

Idade / Peso	Esquema para <i>P.</i> <i>falciparum</i>	Número de comprimidos por dia							
		Primaquina							
		4º dia		5º dia		6º dia		7º ao 10º dias	
1º ao 3º dia	Infantil	Adulto	Infantil	Adulto	Infantil	Adulto	Infantil	Adulto	
6-11 meses 5-9 kg	Artemeter + Lumefantrina (Tabela 5)  ou  Artesunato + Mefloquina (Tabela 6)	1	-	1	-	1	-	1/2	-
1-3 anos 10-14 kg		2	-	1	-	1	-	1	-
4-8 anos 15-24 kg		2	-	2	-	2	-	2	-
9-11 anos 25-34 kg		-	1	-	1	-	1	-	1
12-14 anos 35-49 kg		-	2	-	2	-	2	-	1
≥ 15 anos ≥ 50 kg		-	2	-	2	-	2	-	2

\* Se infecção mista com *P. malariae*, administrar apenas o esquema de *P. falciparum*.  
 - Primaquina infantil: comprimidos de 5 mg, Primaquina adulto: comprimidos de 15 mg.  
 - Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.  
 - Para crianças menores de 6 meses e gestantes no 1º trimestre tratar apenas malária por *P. falciparum* segundo a Tabela 9.  
 - Não administrar Primaquina para gestantes.  
 - Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.  
 - Se surgir icterícia, suspender a Primaquina.  
 - Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de Primaquina (Quadro 3).

**Tabela 9** – Esquema recomendado para tratamento das infecções não complicadas por *Plasmodium falciparum* no primeiro trimestre da gestação e crianças com menos de 6 meses, com Quinina em 3 dias e Clindamicina em 5 dias

Idade / Peso	Número de comprimidos ou dose por dia		
	1º, 2º e 3º dias		4º e 5º dias
	Quinina	Clindamicina	Clindamicina
< 6 meses* 1-4 kg	1/4 (manhã) 1/4 (noite)	1/4 (manhã) 1/4 (noite)	1/4 (manhã) 1/4 (noite)
Gestante 12-14 anos 30-49 kg	1 e 1/2 (manhã) 1 (noite)	1/2 (6 em 6 horas)	1/2 (6 em 6 horas)
Gestante ≥ 15 anos ≥ 50 kg	2 (manhã) 2 (noite)	1 (6 em 6 horas)	1 (6 em 6 horas)

\* A Clindamicina não deve ser usada para crianças com menos de um mês. Nesse caso, administrar Quinina na dose de 10mg de sal/kg a cada 8 horas, até completar um tratamento de 7 dias.  
 - Sulfato de Quinina: comprimidos de 500 mg do sal, Clindamicina: comprimidos de 300 mg.  
 - Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.